RECORDED
IN ANTBIB

Entomotaxonomia 14:244 Cheng, L., Ye, Q., Yang, Y. 1992.

斯里兰卡切叶蚁——中国新纪录
ATOPOMYRMEX SRILANKENSIS—— A NEW RECORD FROM CHINA

[Dec. 1992]

关键词　蚁科　切叶蚁亚科　新记录种

奇异切叶蚁属 *Atopomyrmex*，中国新记录属

Atopomyrmex, Er. André. Rev. d'Ent. Ⅷ (1889), p. 226.

属征：触角12节，唇基的后缘伸长于触角的基部之间，前胸背板不具刺，腹部的梗节2节，梗节的第1个结后面有2齿，体躯上的直立毛简单，不是三裂。

斯里兰卡切叶蚁 *Atopomyrmex srilankensis*，中国新记录种

Emery, Deutsch. ent. Zeit. (1901), p. 114.

☿ 体长3–5mm。微红黄色；上颚颜色比较深，咀嚼缘深褐色；足黄色，关节铁锈色。头、胸，除前胸背板和后胸背板的顶面之外，梗节的结上面和腹末端基部是正规的，但有一些浅的纵印线；前胸背板前面有横印线，边上有纵印线；后胸背板顶端部分和整个腹部，除基部平滑外，光滑而发亮；细毛被苍白色，短而钝，适当多量，触角和足上完全缺如，上述仅是一种淡的、纤细的苍白色短柔毛，只在某些光线下才能见到。

头部：长方形，前面微微缢缩，后面横切，与前面同宽，边上为光亮的弓形，后侧角圆形；上颚三角形，颇狭，有条纹，咀嚼缘有齿；唇基大，中域扁平，前面圆形，中央部分稍波曲；触角隆线短，不凸出；额区明显，三角形；触角柄节粗壮，不伸到头顶，鞭节的棒形成端部3节，略短于鞭节的其余部分，端节同前面2节几乎等长；复眼圆形，位于头中间下面的两侧；单眼明显。

胸部：狭长，比头狭，前胸背板前面圆形，形成背面的一极小部分，并伸长成一颈，后面突然增大和隆起，前面具边，有侧角凸出；中胸背板比前胸背板狭，稍凸起，由1条横隆线同后面交叉，又前侧有2个钝形的凸出结节，中—后胸背缝很明显，彼处胸部压缩；后胸立方形，后胸背板也有2个大的侧结节，位于中胸背板处的对面；后胸背板结节之后为斜面，在后胸后侧角上各有1坚固的三角形短刺，平行并向后指；足适当长并粗壮。

腹部：卵圆形，基部平截，第1节复盖其全长的3/4。梗节：长形，第1个结立方形，其上扁平，前面具柄，没有刺或齿；侧面观为楔形，顶面观长度略大于宽度，两侧半圆形或角状膨大，后端2个粗壮的分叉齿，同结顶保持水平，并向后伸出；第2个结方形，横切，其上圆形，凸起，前角略膨大。

标本采集地：上海市。

分布：印度(加尔各答)；斯里兰卡；缅甸；中国(上海)等。

程　量(CHENG Liang)　叶　勤(YE Qin)　杨　毅(YANG Yi)

(南通师范专科学校生物系，江苏省南通市　226007)

Department of Biology, Nantong Teachers' College, Nantong, Jiangsu 226007